



En direct du CNGOF : RPC utilisation oxytocine au cours du travail spontané INTRODUCTION

Didier Riethmuller, Corinne Dupont
CHRU Besançon

“Safe Prevention of the Primary Cesarean Delivery”



The American College of
Obstetricians and Gynecologists
WOMEN'S HEALTH CARE PHYSICIANS



Society for
Maternal-Fetal
Medicine

OBSTETRIC CARE

CONSENSUS

Number 1 • March 2014

3 causes principales !




Fig. 3. Indications for primary cesarean delivery. (Data from Barber EL, Lundsberg LS, Belanger K, Pettker CM, Funai EF, Illuzzi JL. Indications contributing to the increasing cesarean delivery rate. *Obstet Gynecol* 2011;118:29–38.) ←

Épidémiologie de la mortalité maternelle en France, 2007–2009

Maternal mortality in France, 2007–2009

M. Saucedo^a, C. Deneux-Tharaux^{a,b}, M.-H. Bouvier-Colle^{a,*,b},
Le Comité national d'experts sur la mortalité maternelle¹



2013

L'hémorragie reste la première cause de mortalité en France...

Tableau 4 Décès maternels, effectifs et répartition en%, et taux pour 100 000 naissances vivantes par causes obstétricales détaillées, France entière 2007–2009.

Maternal deaths, number and distribution in %, and maternal mortality ratios per 100,000, by cause of death, France, 2007–2009.

Causes	Effectifs	%	Taux de mortalité ^a
<i>Causes obstétricales directes</i>	147	57,9	6,0
Hémorragies	46	18,1	1,9
Consécutives à grossesse ectopique	5	2,0	
Consécutives avortement	2	0,8	
Placenta prævia	2	0,8	
Placenta accreta/percreta	7	2,8	
Hématome rétro placentaire	3	1,2	
Hémorragie du post-partum	21	8,3	0,9
Rupture utérine	3	1,2	
Plaies chirurgicales et lésions	3	1,2	
Embolies amniotiques	20	7,9	0,8
Thromboembolies	30	11,8	1,2
Embolie pulmonaire	29	11,4	
Thrombose veineuse cérébrale	1	0,4	
Hypertension artérielle gravidique	23	9,1	0,9
Pré-éclampsie	4	1,6	
Éclampsie	12	4,7	
HELLP syndrome	5	2,0	
Autres	2	0,8	
Sepsis	8	3,1	0,3
Complications d'anesthésie	3	1,2	0,1
Autres directes	17	6,7	0,7
Myocardopathie du péri-partum	4	1,6	
Dépression post-partum (suicide)	2	0,8	
Choriocarcinome	2	0,8	
Complication d'un acte de chirurgie obstétricale	3	1,2	
Autres ^b	6	2,4	

Lien HPPI et oxytocine ?

- ✧ France = grande consommatrice d'oxytocine
- ✧ Part de l'HPPI très élevée/aux autres pays d'Europe...
- ✧ ...
- ✧ NB : embolie pulmonaire = 1^{ère} cause des sous groupes
- ✧ ... lien avec césarienne !

Donc... nécessité de RPC !

- ✧ Collaboration CNSF et CNGOF
- ✧ Nouvelles définitions !
- ✧ Recommandations !

- ✧ Place à Corinne Dupont