CHIMIOThERAPIE NEO-ADJUVANTE DANS LE CANCER DU SEIN: QUELLES IMPLICATIONS CHIRURGICALES ?

Anne-Sophie AZUAR

Problématique

- Tumeurs éligibles à une CT
- Deux arguments pour CTNA :
 - Convertir en traitement conservateur
 - Repérer les mauvaises répondeuses et bénéficier d'une ligne II

Problématique

- **Élément crucial** : réponse complète histologique = absence de résidu carcinomateux invasif au niveau mammaire et ganglionnaire sur la pièce opératoire après traitement néoadjuvant

Indications de CTNA

Décision multidisciplinaire +++

- T localement avancées inopérables d'emblée ou localement très avancées : T4, N3
- Cancers TN et HER2+
 - T> ou =2 cm e/o N>=1
 - T1cN0 à discuter selon paramètres cliniques (rapport T/ sein)
- Pas de CTNA** pour les CLI et les RH+/ HER2- peu proliférant N0, non T4

CTNA et TN

CTNA dans les TN : rationnel

- Capecitabine :

Etude createX: N. Masuda et al Adjuvant capecitabine for breast cancer after preoperative chemotherapy. NEJM 2017

CTNA dans les TN : rationnel

ETUDE BRIGHTNESS (ESMO 21) BRCA + et - : Carboplatine NA améliore la SSR à 4A+ TXL après Anthra

- TN : Carboplatine en NA > Diminution des rechutes à distance de 10% à 4 ans

CTNA dans les TN : rationnel

OLYMPIA: olaparib en adjuvant chez patientes mutées selon critères d'agressivité ou de pCR

CTNA dans les TN : rationnel

OLYMPIA: olaparib en adjuvant chez patientes mutées selon critères d'agressivité ou de pCR

CTNA dans les TN : rationnel

ETUDE KEY NOTE 522 : CT/Pembro en NA: pCR+7.7% et tendance OS

- TN plus immunogènes à un stade précoce : Immunothérapie NA, indépendance par rapport score CPS
- Dossier d'accès précoce

CTNA et TTN : quelles indications

- **Le seul consensus vrai : Au-delà de 20 mm et/ou N+**
- **POUR les T1a (< 5 mm) :**
 - Seules recommandations **ESMO** recommandent une **CTNA**,
 - Le REMAGUS, l'ASCO® 2021 et le NCCN le déconseillent
 - **Saint-Gallen module** la décision selon âge

CTNA et TTN : quelles indications

- **Pour les T1b/c : débat ++**
 - Traitement conservateur souvent possible d'emblée
 - Rattrapage mauvaises répondeuses : analyse en **sous-groupe de CREATE-X** (bénéfice capécitabine)
 - Etude de Baron et al : petites tumeurs chimiorésistantes, bénéfique stratégie adjuvante-post CTNA

CTNA et TTN : quelles indications

- **Pour les T1b/c : débat ++**
 - **Pour T moins de 10 mm : chirurgie d'emblée (recommandations de l'ASCO® 2021)**
 - **Entre 10-15 mm et 20 mm, : discussion selon l'âge, sous-type histologique ou le **Ki67 %****
-
- **Mais rattrapage par capécitabine : CTNA dès que possible, amélioration SSR et SG 8%**

CTNA et TTN : quelles indications

- Distinguer certaines TN
- Histologies **pronostic favorable d'emblée** : tumeurs *adénoïdes kystiques* ou les médullaires
- **Réponse défavorable** à CTNA : *apocrines* (0 % réponse), *métaplasiques* (11 % réponse)

- Donc, **sauf N+** : **CTNA pas conseillée pour ces sous-types histologiques.**

CTNA et HER2+

CTNA et HER2 : rationnel

ETUDE KATHERINE

- TDM-1 en cas de reliquat tumoral
- Le risque de récurrence et de mortalité diminue de 50%
- Inclusion T1-T4 (**12% de T1**, 50% de T2, 32% N+)
- Exclusions T1a, T1b, N0 (< 10mm)

CTNA et HER2 : des points de discussion

- **Faut-il faire une CTNA à toutes les HER2+**
 - En cas de mauvaise réponse : TDM1 **améliore la SG**, mais **persiste 12% de rechutes à 5 ans** sous TDM1
 - Risque de **sur-traiter les petites tumeurs**
- **T1a-bN0 RH+** : excellent pronostic avec le **schéma Tolaney**

CTNA et HER2 : des points de discussion

- Schéma Tolaney

Desescalade dans une étude de phase II, actualisée en 2019

TXL Herceptine 12 semaines et Herceptine 9 mois

T1b-c majoritairement

SSR 7 ans de 93%

SG 7 ans de 95%

CTNA et HER2 : des points de discussion

- Schéma Tolaney

Argument pour abaisser le seuil de CTNA 1 cm

2 options :

- **CTNA avec renforcement tt adjuvant si non pCR** ou
- **Chirurgie d'emblée avec désescalade de CT adjuvante**

CTNA et HER2 : quelles indications

- **Le seul consensus vrai : Au-delà de 20 mm et/ou N+**
- **POUR les T1a (< 5 mm) : non**

CTNA et HER2 : quelles indications

- **Pour les T1b/c : débat ++**
 - Traitement conservateur souvent possible d'emblée
 - Rattrapage mauvaises répondeuses bénéfique moins évident
 - **Pour T moins de 10 mm : chirurgie d'emblée (recommandations de l'ASCO® 2021) et Taulaney**
 - **Entre 10-15 mm et 20 mm, : discussion selon l'âge, sous-type histologique ou le Ki67 %**

Etude createX: N. Masuda et al Adjuvant capecitabine for breast cancer after preoperative chemotherapy. NEJM 2017; 376: 2147-59

Etude Katherine: G.Von Minckwitz et al Trastuzumab emtasine for residual invasive HER-2 positive breast cancer. NEJM 2019; 380: 617-28

Impact of Tumor Size on Probability of Pathologic Complete Response After Neoadjuvant Chemotherapy. Ann Surg Oncol. 2016. Baron PP

CTNA et HER2 : quelles indications

- HER2 positif ≥ 2 cm et/ou un envahissement ganglionnaire,
- HER2 positif N+ : double blocage par trastuzumab/pertuzumab (AMM européenne)

CTNA et HER2 : synthèse

- RCP
- **Prudence** dans l'extension des indications aux **T de moins de 2 cm**
- **Bénéfice de la CTNA** *SSR et SG sur petites T HER2 reste à prouver* : sur traitement

CTNA et HER2 : synthèse

Par contre :

- Risque augmenté de perdre la cible : **clipper petites T** plus aléatoires, hématome et migration clip
- **Localisation inexacte initiale** = empêcher élimination complète de la cible
- CTNA = **augmentation de la récurrence locale à 10 A de 3% (groupe collaboratif britannique en 2018)**

Traitements systémiques post CTNA

Stratégie pour PEC T1-T3 TN ou HER2+

Post CTNA : traitement systémique

- **Pour les tumeurs HER2 positif :**
 - pCR après traitement néoadjuvant pour HER2+ : trastuzumab seul si stade initial N0
 - Rattrapage post-opératoire en cas d'absence de pCR: TDM1 14 cycles selon AMM
 - **Pour les tumeurs triple négatives** : capécitabine 6 à 8 cycles après la radiothérapie et après vérification de statut fonctionnel DPD
 - Place demain pour immunothérapie / CTNA

Etude createX: N. Masuda et al Adjuvant capecitabine for breast cancer after preoperative chemotherapy. NEJM 2017

Etude Katherine: G.Von Minckwitz et al Trastuzumab emtasine for residual invasive HER-2 positive breast cancer.NEJM 2019

Event free survival with pemprolizumab in early triple-negative breast cancer P Schmid, J Cortes, R Dent et al. N Engl J Med. 2022

Huo et al. BMC Cancer (2021)

Chirurgie post CTNA

Evolution des paradigmes

- T non opérables > T volumineuses > Bénéfice thérapeutique SSR/SG
- Monitorer et adapter traitements si non pCR

Chirurgie : problématiques

- A qui proposer **CTNA** quand **intervention première faisable**
- Implications sur la **reconstruction**
- Quelles perspectives de **désescalade chirurgie sein**
- Quelle **implication** dans la **chirurgie du ganglion**

Post-CTNA : quelle chirurgie

- Consultation chirurgien avant chimiothérapie +++
- **Exhaustivité du staging** de la lésion avant CT (unifocalité, cytologie ganglionnaire voire biopsie des adénopathies axillaires suspectes...)
- IRM, PET, Clips intratumoral ou N
- N1 confirmé par biopsie/cytologie préthérapeutique : CA post CT ou GG clippé
- Identifier **enquête oncogénétique en urgence** et avant la chirurgie

Post-CTNA : quelle chirurgie

- Quid des marges, quelle cible, pb des réponses fragmentées, extempo macroscopique aidante
- Le traitement conservateur quoi qu'il en coûte ?? Acceptable pour les patientes
- Consentement éclairé des patientes
- Simplification de la surveillance et diminution du risque de RC locale
- Augmentation du taux de mastectomies de 34% en 8 ans chez des patientes éligibles à un traitement conservateur

Post-CTNA : quelle chirurgie mammaire

- RMI non influencée par CTNA
- Pas de majoration des complications post opératoires si 3 semaines autour
- Importance de l'anticipation
- En cas de mastectomie totale post CTNA, RM influencée par âge, stade, nécessité d'une mastectomie bilatérale mais pas CTNA

Collaboration chirurgiens-pathologistes

- Réponse histologique complète : pas de reliquat cellulaire et N0
- RCB (Residual Cancer Burden) : valeur pronostique +++
- Standardisation +++
- Rôle de l'interaction chirurgiens- pathologistes
- Taille avant et après connue (IRM)
- Importance du clip pour orientation des prélèvements

Post CTNA : une chirurgie si pRC ??

- Si réponse complète apparente : macrobiopsie de cloture

- Heil J, Ann Oncol, 2020
- Multicentrique
- Macrobiopsie sous écho
- 164 patientes
- Taux de FN 49%

- Rauch
- Monocentrique (MDA)
- Macrobiopsie sous écho ou stéréotaxique
- 40 patientes
- Taux de FN 5%

- Tasoulis K, JAMA Surg, 2020
- Multicentrique
- Macrobiopsie sous écho ou stéréotaxique
- 166 patientes
- Taux de FN 18%

Sous groupe: cible de 2cm max , bonne réponse clinique, 6 prélèvements minimum
Taux de FN: 3%

Post CTNA : une chirurgie si pRC ??

- **Imagerie actuelle : mauvais pouvoir prédictif > FN 15%**
- **Taux de FN de macrobiopsies de 5-49%**
- Quelle surveillance ultérieure
- Biopsies itératives, climat anxieux >> QUEL VÉCU
- Quels traitements adjuvants

Post-CTNA : quelle chirurgie ganglionnaire

- Recherche du **GS** avant ou après la chimiothérapie
- **Taux FN** moins élevé en cas de **GS** pré CT
- **Post CTNA : FN 11.5%** et non corrigé par CT
- Deux situations lors **évaluation axillaire préthérapeutique avant CTNA**
 - **N0** (GANEA 2 : **0.2%** de RA à 3A)
 - Preuve **N+** avant CTNA (biopsie) : ETUDE SENTINA GS/CA post CTNA : FN 24% si 1GG, si 2 18%

CLIPPER le gg : diminution du FN

Avant CTNA : quelle chirurgie ganglionnaire

1. Pour les patientes NO clinique qui ont eu une mastectomie et pour lesquelles une RT est prévue, une radiothérapie axillaire peut être proposée à la place du curage axillaire pour le traitement locorégional.

2. Considérer la radiothérapie axillaire pour les patientes à haut risque (cf chapitre Radiothérapie)

3. Pour des patientes sélectionnées qui présentent des tumeurs favorables ou qui ont sévères comorbidités, dont l'âge, l'indication d'un curage axillaire complémentaire peut être discutée en RCP.

4. En cas de mastectomie et respect de tous les autres critères ACOSOG, l'absence de reprise de curage axillaire avec radiothérapie du creux axillaire est une option (AMAROS).

Post-CTNA : quelle chirurgie ganglionnaire

Post-CTNA : quelle chirurgie axillaire

- Bonne **évaluation clinico radiologique de l'aisselle** avant CTNA
- Perte de chance si sous stadifié au niveau axillaire
- **pN- avant CTNA** : après **CTNA GS >> PAS DE CA**
- **pN+ avant CTNA** : repérage du **gg métastatique>>** après CTNA réséquer ce ganglion et curage, inclusion dans GANEA 3

Nomogramme pour évaluation statut gg aisselle

Post-CTNA : quelle chirurgie axillaire

- **Comment repérer le gg clippé**
 - Grain d'iode (mais indisponible en France hors protocole)
 - Fil métallique = structures vasculo nerveuses mais repérage 92%
 - Charbon : pas AMM en France
 - Particule magnétique : 100% de pertinence

Messages

- Bénéfice thérapeutique de la CTNA pour TN et HER2+ >2 cm et/ou N1
- Bénéfice de la CTNA mal évalué pour petites T <2 cm N0
- Abstention chirurgicale si pCR **non envisageable** car limites imagerie, limites macrobiopsie et choix patientes

Messages

- **Meilleure sélection** des patientes pouvant **tirer bénéfice de la CTNA** :
 - Sous-types moléculaires TN, biomarqueurs (TIL, PDL1, signature immune, HRD...)
- **Modification du seuil d'indication CTNA**
- Place des **sels de platine**, **immunothérapie**, les inhibiteurs de **PARP**, les inhibiteurs aux récepteurs androgènes.. supérieurs à CTNA
- **Place future pour la chirurgie dans rCP**

Merci de
votre
attention

POST CTNA HER

Cancers du sein POST NEOADJ	En cas de non pCR (RCB I-III)
HER2+++	<ul style="list-style-type: none">• T-DM1 en remplacement du Trastuzumab (LOE1) pour 14 cures<ul style="list-style-type: none">- Radiothérapie standard pendant le TDM1 (TDM1 compatible avec la radiothérapie)- Hormonothérapie doit être débutée pendant le TDM1

Cancers du sein POST NEOADJ	En cas de pCR
HER2+++	<ul style="list-style-type: none">• Poursuite Trastuzumab pour 18 cures au total• Option : Double blocage par trastuzumab pertuzumab (14 cures) possible si envahissement ganglionnaire initial (non remboursé)• Radiothérapie si indiquée pendant le trastuzumab

RTE et CTNA

▲ Cancers du sein POST NEOADJ : En cas de non pCR (RCB I-III)

- **Triples négatifs** : Capécitabine 6-8 cycles (après vérification du statut fonctionnel DPD) **compatible avec la radiothérapie standard avec dose adaptée : 825mg/m² 2 fois par jour 5 jours sur 7**, puis revenir à un schéma standard : 1000 à 1250 mg/m² 2 fois par jour de J1 à J14 tous les 21 jours
- **HER2+++** : T-DM1 en remplacement du Trastuzumab pour 14 cures + **Radiothérapie standard pendant le TDM1** (risque de pneumopathie majoré, risque de « recall effect »)

▲ Cancers du sein POST NEOADJ : En cas de pCR

- **HER2+++** : **Radiothérapie standard compatible avec le trastuzumab**

▲ Hormonothérapie à débiter de préférence après la radiothérapie mais pas de contre indication en concomitant pour les anti aromatasés