Désescalade thérapeutique dans le traitement chirurgical du cancer du sein

Pierre AZUAR

2022

Avant 1968 : HALSTED

Umberto VERONESI, étude sur traitement conservateur

Consensus de 1980 :

Traitement conservateur $T < 3\text{cm}$

Exérèse chirurgicale de la tumeur le temps thérapeutique le plus important et le plus efficace pour le contrôle local et la guérison

2 objectifs du traitement conservateur :

- Taux de survie, idem mammectomie,
- Bon résultat esthétique.

En 2022 > 70% de traitements conservateurs

L'exérèse glandulaire doit avoir ses marges en tissu sain

Décollement cutanéoglandulaire et pré-pectoral préalable

Section des berges au bistouri froid à 10 mm des contours de la tumeur palpée

Si hameçon : 10 à 15 mm au-delà du siège de l'hameçon

Agrafes vasculaires dans le lit tumoral pour
complément d'irradiation

Pièce repérée

Fils dans les 3 dimensions de l'espace
Marquer au bleu la face antérieure
L'extemporanée – La radio de la pièce

La chirurgie Oncoplastique

Est à individualiser

De la RMI ou RMS après mammectomie

Utilise en chirurgie carcinologique conservatrice
des techniques dérivées de la chirurgie plastique

L' oncoplastie est issue de 2 spécialités chirurgicales :

- * Doit permettre les exérèses larges**
- * Réduire les séquelles de la chirurgie d'exérèse**

Associée à l'évaluation des ganglions sentinelles et à la radiothérapie

Si traitement conservateur et séquelles importantes, le traitement secondaire de ces séquelles est difficile surtout après radiothérapie

Consultation pré-opératoire :

Le type de chirurgie conservatrice oncoplastique est fonction de

- * L'importance de la résection, de l'asymétrie et de la malposition de l'aréole,**
- * Du siège, segment 3,**
- * Du rapport taille tumorale/taille sein.**

Etendre les indications du traitement conservateur à des lésions traitées par mammectomie :

- * tumeurs centrales superficielles**
- * cancers > 3cm**
- * lésions quadrants inférieurs**

La chirurgie oncoplastique permet un traitement conservateur

Dans les tumeurs centrales superficielles rétro-aréolaires :

- Si tumeur à moins de 2cm de la PAM risque d'envahissement de la PAM 75%
- Remodelage du sein
- Plastie de symétrisation
- PAM reconstruite sous AL après la radiothérapie

Tumeurs centrales superficielles rétro-aréolaires :

Pamectomie :

Correction de

l'asymétrie mammaire :

Reconstruction de la PAM,

3 mois après la fin

de la radiothérapie:

La chirurgie oncoplastique permet un traitement conservateur

Dans le cancer du sein de plus de 3cm

- Résection large in sano
- Réduire le taux de récurrence locale
- D'améliorer les résultats esthétiques
- D'étendre les indications du traitement conservateur à des lésions jusqu'alors traitées par mammectomie dans le strict respect des principes carcinologiques

MAC KISSOCK

Pour tumeur du

quadrant supéro-externe,
quadrant inféro-externe,
quadrant inféro-interne :

MAC KISSOCK

Si gigantomastie et tumeurs inférieures : THORECK

Tumeurs des quadrants supérieurs :

**Jonction des quadrants supérieurs : Robbins,
Moufarrége**

Dans les lésions du segment 3

AUTRES TECHNIQUES

Remodelage unilatéral, mobilisation des lambeaux glandulaires

**Ces techniques ont une sécurité
carcinologique :**

- * risque de récurrence locale < 10% à 5 ans,**
- * la survie sans récurrence identique .**

SI MASTECTOMIE TOTALE

SKIN SPARING MASTECTOMY

NIPPLE SKIN SPARING

MASTECTOMY

RMI

RMS

Symétrisation du sein opposé : en un temps ou à distance

3% de cancers occultes sein opposé

Mais :

Résultats imparfaits et « retouches chirurgicales » à distance sont nécessaires .

Évaluation des résultats esthétiques difficile,

Excellents 43% patientes
24% opérateurs

Le curage axillaire était le gold standard

> 40 % des patients N0 cliniques sont N+
11 % des N1 ou N2 sont N-

Complications du curage axillaire

Retard de cicatrisation locale	2 à 8 %
Infection	
Lymphorrhée excessive	15 à 30 %
Lymphocèles	5 à 50%
Troubles sensitifs du bras	20 à 30%
Bride rétractile	30%
Raideur – fatigabilité	8 à 40%
Douleur	15 à 30%
Lymphoedème	8 à 40%

**Le taux d'envahissement
ganglionnaire dans les
T1 est de 18,8 %**

**La biopsie du ganglion
sentinelle a remplacé le
curage axillaire**

Avant la tumorectomie

- *Incision transversale de l'aisselle basse*
Racine des poils

- Suivre le cheminement du Bleu dans le canal lymphatique

- Si ganglion Bleu repéré ou pas de Bleu visible avec le comptage élevé de la sonde

Les radios colloïdes

- Colloïde marqué au technétium 99,
- Sonde à détection de rayonnement gamma transcutanée,
- Coûteuse, service de méd. Nucléaire,
- Pas de réaction allergique connue.

TI > 95%

TFN < 5%

Nombre de ganglion en
moyenne 2

Injection péri aréolaire
TI supérieur (Rodier
2007)

Identification du
ganglion MI moins
bonne

A-t-on des complications au cours des biopsies du G.S?

Avec G.S

- Morbidité réduite par rapport au C.A
 - Moins de lymphoedème
 - Moins de gonflement
- Mais morbidité non nulle
 - Abscès 1%
 - Lymphocèle 7%
 - Hématome 1,4%
 - Paresthésie axillaire 8,6%
 - Diminution de la sensibilité du membre supérieur 3,8%
 - Risque de lymphoedème de > 2 cm 6,9%

Taux de réaction allergique

Institution	Number of patients	Number of systemic reactions	Percentage
University of Michigan	267	5	1.9
M. D. Anderson	639	7	1.1
Mount Zion Cancer Center	406	3	0.7
Columbia-Presbyterian	351	3	0.9
Total	1663	18	1.1

Ian K. Komenaka et al. Allergic Reactions to Isosulfan Blue in Sentinel Lymph Node Mapping The Breast Journal, Volume 11 Number 1, 2005 70-72

Pronostic

- Favorable, sans séquelle, dans nos deux cas et ceux décrits dans la littérature

Le prélèvement va être confié à l'anapath

- L'INTRODUCTION DE LA BGS AU DEBUT DES ANNEES 2000 A REDUIT LES INDICATIONS DU CA

Indications du CA complémentaire selon le statut histologique du GS:

BGS

EVITABLE

**Carcinome tubuleux
carcinome mucineux**

- **CANCER pT1a**
N+<10%
GRADE 1 pT1b
N+<10%

« L'exérèse chirurgicale de la tumeur du sein reste le temps thérapeutique le plus important et le plus efficace en terme de contrôle local et de guérison »

K. CLOUGH

Le chirurgien est un facteur du pronostic

Les objectifs de la chirurgie doivent être :

- Cancérologiques
- Et esthétiques