Malformations utéro-vaginales et rétention menstruelle : à propos de 18 cas

Drs Makhoulouf T – Berrais G

Service A de Gynécologie-Obstétrique
Hôpital Charles Nicolle Tunis
JUAN LES PINS ANTIBES 23-24 Juin

Epidémiologie

- Prévalence: 1 à 4%
- Problème = fertilité (10% hypofertilité)
- Rôle de l'imagerie: orientation diagnostic, pronostique, thérapeutique

Rappels Embryologiques

Le développement de l'appareil génital féminin est étroitement lié à celui de l'appareil urinaire du fait de l'approximité anatomique de leurs précurseurs : canaux de Muller et les canaux de Wolff

Rappels Embryologiques

2 canaux de Muller : trompe de Fallope
Utérus $2/3 >$ vagin

Sinus urogénital: $1/3 <$ vagin

Rappels Embryologiques

6-9 semaines de gestation

Migration canaux
de Muller vers
sinus Uro-Génital

Rappels Embryologiques

9-10 s

fusion 1/3 < des
canaux de Muller
Formation cavité
Utérine + 2/3 >
vagin

Rappels Embryologiques

10-13 s: résorption cloison
inter-mullérienne

Classifications

Etiologie	Classification de Musset (1964)	Classification d'AFS(1988)
<i>Aplasia canaux Muller</i>	<u>Aplasia Mullérienne bilatérale:</u> Sd de Rokitansky-Kuster-Hauser <u>Aplasia Mullérienne unilatérale:</u> Utérus unicorne Utérus pseudo unicorne	Type I: Hypoplasie, agénésie Type II: Utérus unicorne
<i>Trouble fusion canaux</i>	Utérus bicorne bicervical Utérus bicorne:Unicervical total/corporéal/fundique	Type III:Utérus bicorne bicervical Type IV; Utérus bicorne
<i>Trouble résorption</i>	Utérus cloisonné: Total/subtotal/corporéal/fundique Utérus à fond arqué Utérus communicant	Type V: Utérus cloisonné (Va: partiel, Vb:total) Type VI: Utérus à fond arqué
	Hypoplasie utérine	Type VII: Utérus DES

Classifications actuelles

Classification ESHRE

Classification ESGE

Diagnostic positif

- Interrogatoire ++
- Examen clinique minutieux
- Examens paracliniques:
 - Echographie
 - *Suspubienne/vaginale (2D/3D)
 - *Rénale
 - IRM
 - Hystérocopie - coelio

Diagnostic positif: examen clinique

- développement vulvaire périnéal
- existence d'un hymen, perméabilité/profondeur vaginale
- examen au spéculum: cloison, symétrie des cul de sacs, col (nombre, aspect)
- TV et TR: corps utérin, masse pelvienne, bombement de la paroi vaginale

Diagnostic positif: échographie

- Echographie 2 D, Echographie 3D
- Examen de choix chez la jeune fille
- Diagnostic positif de certaines malformations
- Cavité utérine, myomètre
- Echo rénale (agénésie/malformation)
- Bilan lésionnel d'amont +/-

IRM

- Possibilité de réaliser des coupes dans les trois plans de l'espace, associée à une bonne résolution de contraste et spatiale
- Permet l'étude de l'ensemble des canaux de Müller (utérus et vagin) et de l'appareil urinaire
- Coût relativement élevé de l'examen
accès parfois difficile

Endoscopie

- Couple HSC- Coelio : étude directe de la morphologie utérine, état tubaire
- Hystéroscopie: permet le traitement d'une anomalie muqueuse ou d'une cloison
- Coélioscopie: - hypofertilité,
 - malformations complexes
 - bilan lésionnel précis d'amont
 - but thérapeutique

Types de rétention menstruelle

-La rétention menstruelle complète:

Amenorrhée primaire douloureuse

-La rétention menstruelle partielle

Dysmenorrhée

Rétention Menstruelle Complète: Aménorrhée primaire douloureuse

- Imperforation hyménéale
- Diaphragme vaginal complet
- Aplasie vaginale partielle ou totale avec utérus fonctionnel
- Aplasie ou atrésie cervicale isolée avec isthme fonctionnel (exceptionnelle)

Imperforation hyménéale

- Cryptoménorrhée

- CSS normaux

- Inspection vulve : diagnostic

Masse pelvienne : Hématocolpos

Rétention urinaire

- Echographie: hématocolpos / bilan retentissement d'amont +/-

Absence de malformation rénale

Hydrométrocolpos

Hématocolpos

Echo Hématocolpos

IMAGE 76
SER 1-5

HA

R

*Hymenectomy for
Imperforate Hymen*

Diaphragme vaginal complet

10 Diaphragme complet

Aplasia vaginale partielle ou totale avec utérus fonctionnel

Aplasia vaginale isolée
<10 % des aplasies
rétention menstruelle

Intérêt IRM:

Diagnostic

Intérêt coelioscopie :
bilan d'amont

Atrésie isolée du col

Atrésie cervicale

Figure 2 Diagrammatic anatomical comparison between the traditional cervix classification for abnormal development and the proposed cervical atresia typing (coronal uterus view).

Aménorrhée primaire non douloureuse

■ Aplasies cervico-isthmiques et vaginales

- <1 % des aplasies
- Pas de Menstruation

Absence de rétention

Rétention Menstruelle Incomplète: Dysménorrhée

- Date d'apparition : puberté +++
- Douleurs latéralisées puis diffuses, intensité croissante, cyclique, résistante au TTT médical
- → penser à une rétention menstruelle unilatérale
- Le plus souvent : hémivagin borgne
Rarement : corne rudimentaire canaliculée non communicante

Hémivagin borgne

- Caractère unilatéral des douleurs
- Examen spéculum (si possible):
bombement latéral de la paroi vaginale
- TR: masse pelvienne latéralisée sous
jacente à l'utérus
- Echographie: masse liquidienne
surmontée d'un utérus bicorne dont l'un
des héli-utérus est dilaté, Agénésie
rénale homolatérale

b- Dysménorrhée = Hémivagin borgne

Toujours associé à une malformation utérine :
utérus bicorne bicervical le plus souvent
Aplasia rénale constante du côté borgne

■ Echographie pelvienne par voie sus pubienne

Hémivagin borgne

➔ IRM pelvienne

- Résection large de la cloison vaginale permettant un drainage continu de l'hémi utérus rétentionnel avec marsupialisation
- Coélioscopie à la recherche des répercussions tubaires et pelviennes. (Nodules d'endométriose+++)
AVEC ADHERENCES

COELIOSCOPIE → RETENTISSEMENT EN AMONT

ABSENCE

PRESENCE

- Hématosalpinx volumineux
- Greffes endométriosiques
- Adhérences péri-annexielles

TT CONSERVATEUR

- 1) Débridement : Evacuation de la rétention menstruelle

ANTIBIOTIQUES
OCYTOCIQUES

- 2) Unification à plein canal :
résection de la cloison

TT RADICAL D'EXERESE

HEMI-HYSTERO-COLPECTOMIE

(pas de préoccupation urétérale)

Utérus pseudo unicorne

- Echographie : corne complète
- Visualisation de la corne rudimentaire parfois difficile (petit volume, position ectopique..)
- → intérêt de l'écho 3D
- Rechercher un endomètre résiduel
- Malformation rénale (30%)

Utérus pseudo unicorne

- HSG : pas de certitude de diagnostic
- IRM : Intérêt +
- Coelioscopie : Diagnostic de certitude
Geste chirurgical
(Salpingectomie/ résection corne)

Utérus pseudo unicorne

a- communicating

b- non communicating

c- no cavity

65EV13

- **Echographie pelvienne: cavité utérine vide avec présence en laterouterin d'un sac gestationnel embryonné entouré d'une couronne de tissu myometrial peu épaisse % à l'autre hémicavité vide**
- **Par ailleurs, pas d'épanchement en intra abdominal.**

■ Il s'agit d'une grossesse ectopique sur une corne rudimentaire dans le cadre d'un utérus pseudo-unicorné

■ **Exploration coelioscopique montrant la présence d'une corne utérine rudimentaire contenant une grossesse évolutive et avancée avec une paroi fine très vascularisée**

► **Réséction de la corne rudimentaire**

+

Salpingectomie homolatérale

La coéloscopie peut confirmer le diagnostic et il est utile de réséquer la corne accessoire, lorsque la trompe et la corne sont fonctionnelles.

• Utérus pseudo-unicorne, aspect coelioscopique. Utérus unicorne visible au contact de la pince et corne rudimentaire borgne controlatérale (flèche).

NOTRE SÉRIE

Objectif

Analyse de la sémiologie clinique, des données radiologiques et du retentissement d'amont.

Matériels et méthodes

Etude rétrospective de 18 patientes présentant des malformations utéro-vaginales s'accompagnant de rétention menstruelle colligées durant une période de 4 ans allant du 01 Janvier 2017 au 31 Décembre 2020. **15 cas de rétention complète et 3 cas de rétention incomplète.**

Rétention menstruelle complète

1 / Imperforation hyménale : 13 cas:

- Age:13-19 ans, Aucun cas similaire dans la famille.
- Aménorrhée primaire douloureuse avec des caractères sexuels secondaires normaux dans tous les cas avec un cas de rétention aigue d'urine.
- L'inspection de la région vulvaire : un hymen bombant bleuté ou violacé imperforé dans tous les cas.
- Echographie sus pubienne: présence d'un hémocolpos dans tous les cas: une image arrondie hypoéchogène rétro-vésicale allant de 4 à 12 cm.
- Traitement chirurgical dans tous les cas: Hyménéotomie par incision radiaire permettant l'évacuation de sang vieilli

Hydrométrocolpos

Hématocolpos

2 / Atrésie isolée du col :

- Mme R.M, âgée de 17 ans, vierge
- Aménorrhée primaire douloureuse + douleur pelvienne chronique avec des CSS normaux
- Examen: masse hypogastrique avec un hymen perforé.
- Echo: Utérus cloisonné + hématométrie de l'hémi-cavité droite. Reins en place .
- IRM : utérus cloisonné avec rétention hématique au niveau de la corne droite.
- Coélioscopie :utérus malformé cloisonné avec rétention menstruelle droite en rapport avec une aplasie isolée du col droit : absence de région cervicale droite + absence du ligament utéro sacré droit + absence de lésions endométriosiques
- Traitement : hémi hystérectomie droite anatpath :rétention hémorragique sur hémi- utérus (absence du col)

UDY 1
09/2014
29:07
MA 10 / 1

F 2.00
R 4010.0
E 80.0
A 02:45
V 191.0
NORM/DIS2D

ISSA
TY

3 / Diaphragme vaginal :

- Mme M.A 46 ans, cycles réguliers auparavant , G3P3 utérus tricatriciel, aménorrhée secondaire douloureuse + dysurie + dyspareunie +douleur pelvienne chronique.
- L'examen : diaphragme vaginal complet 1/3 INF du vagin.
- Echographie hémocolpos de 8 cm.
- Le traitement: résection complète. Il s'agit d'un diaphragme initialement incomplet très serré qui s'est re-sténosé suite à des phénomènes infectieux

Rétention menstruelle incomplète:

1 / Hémi vagin borgne : Deux cas

- Célibataires de 18 ans Dysménorrhée unilatérale
- Examen : bombement de la paroi latérale du vagin
- Echographie: rétention menstruelle unilatérale surmontée d'un utérus malformé bicorne dans un cas et d'un utérus cloisonné dans le cas restant .

Agénésie rénale homolatérale dans les deux cas.

- IRM: hémocolpos unilatéral surmonté d'un utérus malformé sans signes d'endométriose.
- Coélioscopie: utérus en masse unique étalé transversalement avec présence d'une dépression médio-utérine .
- Tt : section et résection de la cloison dans les deux cas .
- Evolution : survenue d'une grossesse menée à terme accouchement par césarienne d'un bébé eutrophique .

2 / Utérus pseudo unicorne :

- Mme Y.A,32 ans, infertilité primaire de 2ans.
- Dysménorrhée unilatérale gauche .
- Examen: Normal
- Bilan: Normal
- Echographie: utérus pseudo unicorne droit + reins en place .
- HSG : utérus unicorne dévié à gauche avec opacification de l'hémi cavité droite (corne rudimentaire communicante)
- IRM: hémi utérus gauche + corne rudimentaire latéralisé à droite canaliculée.
- Coélioscopie: hémi cavité utérine gauche + corne rudimentaire droite + lésions d'endométriose au niveau de l'annexe droite .
- Tt : résection de la corne droite + ablation des lésions d'endométriose

**Attention à la survenue
de GEU = Rupture cataclysmique!!!**

Conclusion

- Sémiologie clinique **variable**
- Apport de l'imagerie **Echo 3D, IRM**
- Apport **coelioscopie** :
Retentissement / thérapeutique