Prise en charge des nausées et de l'hyperémésis gravidique

RPC-conférence formalisée d'experts 2022

Dr Jeremy Boujenah
Hôpital diaconesse

Consensus formalisé d'expert plutôt que RPC

Très faible qualité de la preuve scientifique apportée par les études

Pas de GRADE de recommandation

Consensus formalisé d'expert = meilleure pratique à proposer aux patientes

Méthode DELPHI: « consensus par la communication de groupe.... »

Médiane	1-2-3	4-5-6	7-8-9
Décision	Opposition	Indécision	Accord
Consensus	Faible		Fort

Fréquences

NVG: « forme peu sévère » : pas d'altération

HG: « forme sévère » altération qualité de vie, relations familiales, et environnement professionnel

0,3-3,6% : vomissements incoercibles

✓ Risque de récurrence : 15-80%

- Formes familiales (cause génétique ?)

FACTEURS DE RISQUES

Portage Helicobacter Pylori
Génétique
Faible IMC
Fœtus de sexe féminin
Grossesse multiple
ATCD personnel

Récepteur TSH
Hormone thyroïdienne/stéroïdiennes
HCG
Ghréline/leptine
GDF15/IGFP7 (protéine placentaire)

Pas de preuve d'une étiologie psychosomatique, ni d'une association entre HG et trait caractéristique de personnalité

CONSEQUENCES

Retentissement perso/pro = Stress, idée suicidaire

Du risque de PAG

naissances prématurée

Encéphalopathie de Gayet-Wernicke (vit B1)

Dysostose maxillo-faciale (sd blinder)

IVG et renoncement grossesse ultérieure

Pas d'augmentation de complication vasculaire de la grossesse, de malformation fœtale, et de trouble comportement ou psychique à l'âge adulte

DEFINITION DE NAUSEES ET VOMISSEMENT GRAVIDIQUE

Prop 1.1: Nausée et vomissement débutant au 1^{er} trimestre de la grossesse en l'absence d'autre étiologie

✓ Examen clinique seul

✓ Pas de bilan biologique à visée étiologique

✓ Echographie obstétrical

- Grossesse multiple ?

- Môle ?

SUR QUELS ÉLÉMENTS DOIT REPOSER L'ÉVALUATION INITIALES DE LA SÉVÉRITÉ DES NVG

Prop 1.2: L'évaluation initiale de la sévérité repose **sur 3 critères cliniques**

Perte de poids rapportée au poids avant grossesse

Signes cliniques de déshydratation

Score PUQE modifié

En moyenne durant une journée, combien de temps/de fois

Score	1	2	3	4	5
Vous sentez vous nauséuse ou avez-vous mal au cœur?	Pas du tout	Moins d'1h	2-3h	4-6h	> 6h
Vomissez vous ?	Pas du tout	1-2 fois	3-4 fois	5-6 fois	≥7 fois
Avez-vous eu des haut le cœur ou des renvois sans véritable vomissement	Pas du tout	1-2 fois	3-4 fois	5-6 fois	≥7 fois

DEFINITION ET BILAN DES NVG NON COMPLIQUÉS

Prop 1.3: Nausées et vomissements sont non compliquées si:

Prop 1.4: Ne pas réaliser de bilan biologique ou d'imagerie (autre que échographie obstétrical) en cas de nausée et vomissement non compliquée

DEFINITION ET BILAN DE L'HYPEREMESIS GRAVIDIQUE

Prop 1.5: L'hyperemesis gravidique est défini comme des NVG associée à au moins un signe clinique :

Perte de poids $\geq$
5%

Un ou des
cliniques de
déshydratation

Score PUQE
modifié ≥ 7

Prop 1.6: Réaliser devant toute HG, un dosage sanguin de la K⁺, NA⁺, créatinémie, bandelette urinaire

Prop 1.7: En cas de persistance ou aggravation malgré un traitement bien conduit, le bilan pourra être compléter NFS, ASAT/ALAT, Lipasémie, Echographie abdominal, CRP, T4/TSH, à la recherche d'un diagnostic différentiel

CRITERE D'HOSPITALISATION EN CAS D'HG

Prop 1.8: Prise en charge externe pour les NVG non compliquée

Prop 1.9: Hospitalisation en cas d'HG lorsqu'elle est associée à un des critères suivants

Perte de poids $\geq 10\%$

Un ou des signes
de déshydratation

Score de PUC ≥ 13

Hypokaliémie $< 3.0\text{mmol/L}$

Hyponatrémie $< 120\text{ mmol/l}$

Elévation de la créatinémie $> 100\mu\text{mol/L}$

Résistance au traitement

Objectif = Réhydrater en IV

PRISE EN CHARGE NON MEDICAMENTEUSE

Règles hygiéno-diététique

Prop 2.1: Arrêter les vitamines prénatales et privilégier l'acide folique seule car la supplémentation en fer au 1^{er} trimestre semble aggraver les symptômes

Prop 2.2: Adaptation libre du régime alimentaire et de leur mode de vie en fonction de leur symptômes puisqu'aucune modification du régime alimentaire ou mode de vie n'a prouvé son efficacité pour améliorer les NVG et HG

PRISE EN CHARGE NON MEDICAMENTEUSE

Gingembre

Prop 2.3: Réserver le gingembre aux femmes ayant un score PUQE $\leq$ 6, s'il devait être utilisé, sachant que l'amélioration des symptômes après sa prescription n'est pas formellement démontrée

Pyridoxine (vitamine B6)

Prop 2.3: Réserver la vitamine B6 aux femmes ayant un score PUQE $\leq$ 6, s'il devait être utilisé, sachant que l'amélioration des symptômes après sa prescription n'est pas formellement démontrée

PRISE EN CHARGE NON MEDICAMENTEUSE

Aromatherapie (huile essentielle)

Prop 2.5: Il est proposé de ne pas utiliser l'aromathérapie pour la prise en charge des NVG non compliquée en raison des risques potentiels associés aux huiles essentielles et de l'absence d'efficacité démontrée.

EN PRATIQUE

- **Ne pas inquiéter** une patiente exposée par inadvertance à des huiles essentielles.
- **En cours de grossesse**, au vu des éléments disponibles, les préconisations générales que nous pouvons proposer sont les suivantes :
 - En usage thérapeutique : plutôt s'abstenir en l'absence de donnée tant sur le bénéfice que sur le risque.
 - En cosmétologie/hygiène : s'en remettre aux mentions figurant sur les produits ou leur notice.
 - En exposition professionnelle : se rapprocher du médecin du travail pour faire le point sur les conditions d'exposition et la conduite à tenir pour la suite de la grossesse.

PRISE EN CHARGE NON MEDICAMENTEUSE

Acupression, acupuncture, électrostimulation

Prop 2.6: Réserver ces techniques, aux femmes ayant un score PUQE $\leq$ 6, s'il devait être utilisé, sachant que l'amélioration des symptômes après sa prescription n'est pas formellement démontrée

Prop 2.7: Ne réserver la prise en charge **non médicamenteuses des NVG**, à l'exception de l'aromathérapie, **que aux femmes avec des formes non compliquées**

Efficacité

Inefficacité

PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE

Prop 3.1: Toujours choisir pour des utilisations en 1^{er}, 2^{ème} ou 3^{ème} intention, les médicaments associées aux effets secondaires les moins sévères et les moins fréquents, compte tenu de l'absence de supériorité d'une classe médicamenteuses par rapport à une autre pour réduire les symptômes des NVG et HG

PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE

Vitamine B1

Prop 3.2: Il est proposé que soit systématiquement administrée de la vitamine B1 en cas d'HG, justifiant d'une réhydratation parentérale afin de prévenir la survenue d'une encéphalopathie de Gayet-Wernicke

Aggravation de l'encéphalopathie lié à carence B1 (glucose augmente les besoins en B1 dans noyaux de v3/v4, tubercule mamillaires)....

PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE

Doxylamine-Pyridoxine

Retire statistical significance

Valentin Amrhein, Sander Greenland, Blake McShane and others call for an end to hyped claims and the dismissal of non-significant results.

P values are the 'gold standard' of statistical validity, are as reliable as many scientists assume.

ion du sco

2,8 ± (-2,8

The ongoing tyranny of statistical significance testing in biomedical research
Andreas Stang · Charles Poole · Oliver Kuss

ELSEVIER
A Dirty Dozen: Twelve P-Value Misconceptions
Steven Goodman
Seminars in HEMATOLOGY

That Confounded P-Value

Sec... évalué contre placebo

The fickle P value generates irreproducible results
Lewis G Halsey, Douglas Curran-Everett, Sarah L Vowler & Gordon B Drummond

The ASA's Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose
Ronald L. Wasserstein & Nicole A. Lazar
To cite this article: Ronald L. Wasserstein & Nicole A. Lazar (2016) The ASA's Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose, The American Statistician, 70(2), 129-133, DOI: 10.1080/00031305.2016.1154108
To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/00031305.2016.1154108>

REPRODUCIBILITY
Statisticians issue warning on P values
Statement aims to halt missteps in the quest for certainty.

En revanche, l'asso... semblant montrer le

PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE

Autres anti-émétiques

- ✓ Petites études comparants les molécules entre elles (aucune versus placebo)
- ✓ Globalement pas de différence dans l'efficacité
- ✓ Tenir compte des effets secondaires **innocuité**

Neuroleptique et phénothiazine : Risques augmenté de syndrome extrapyramidaux (sommolence, tremblements, vertiges, dystonie)

Corticoïdes: retour de l'appétit et gain de poids plus rapide mais effets secondaire

PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE

Ondansétron

✓ Pas d'AMM

✓ Risque augmentée de fente labio-palatine à la naissance (0,11% vs 0,08 % en population générale)

pour 10 000

Centre de Référence sur les Agents Tératogènes
C R A T

Ondansétron - Grossesse et allaitement

EN PRATIQUE

- **Traiter une femme enceinte**
 - Dans les situations où la **doxylamine**, le **métoclopramide** ou la **dompéridone** ne conviennent pas, l'utilisation de l'ondansétron est envisageable. Si possible, l'ondansétron sera par précaution débuté après 10 semaines d'aménorrhée (SA) (fin de la période d'organogenèse) en raison des données récentes qui doivent être confirmées (cf. Etat des connaissances).

PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE

En résumé...

Comment aider les femmes ??

Statistics Notes

Absence of evidence is not evidence of absence

Douglas G Altman, J Martin Bland

Aider

Sans nuire

Accompagnement d'une femme avec HG

Prop 4.1: Il est proposé de ne pas mettre à l'isolement (mise dans le noir, confiscation du téléphone portable ou interdiction de visites...), les patientes hospitalisées pour HG, en raison de l'absence d'efficacité et de possibles effets psychologique délétères

Prop 4.2: Il est proposé d'offrir la possibilité d'un soutien psychologique à toutes les patientes atteintes d'HG en raison de l'impact négatif de cette pathologie sur le bien-être psychique

Encourager le soutien psychologique ce ces patientes

9 mois avec ma bassine
Association de soutien
contre
l'Hyperémèse Gravidique

Algorithme de PEC

Algorithme de PEC

Nausée et Vomissement
gravidique non compliquée

AMBULATOIRE

1^{er} intention

Gingembre
Ou Doxylamine
Ou Doxylamine + Pyridoxine
Ou Dimenhydranate

Réévaluation H72

2^{ème} intention

Metoclopramide

Réévaluation H72

3^{ème} intention

Chlorpromazine
Promethasine
Metopimazine

Hyperemesis gravidique
sans signe de gravité

AMBULATOIRE

1^{er} intention

Ou Doxylamine
Ou Doxylamine + Pyridoxine
Ou Dimenhydranate

Réévaluation H48

2^{ème} intention

Metoclopramide

Réévaluation H48

3^{ème} intention

Chlorpromazine
Promethasine
Metopimazine

Hyperemesis gravidique
avec signe de gravité

HOSPITALISATION

1^{er} intention

Metoclopramide IV si non testé

2^{ème} intention

Ondansétron IV après 12 SA*
Ou Chlorpromazine IV
Ou Prométhasine IV avant 12 SA

3^{ème} intention

Corticoïde IV

*oui avant 12 SA si information risque fente 3/10000

Tout n'est pas si simple...

EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

26 July 2013
EMA/443003/2013

European Medicines Agency recommends changes to the use of metoclopramide

Dose maximum : 30mg par jour ou
0,5mg/kg

Durée $\leq$ 5 jours

Injection lente : Bolus $>$ 3 min

Question en suspens

Epidemiology of Pregnancy-associated Venous Thromboembolism: A Population-based Study in Canada

Shiliang Liu, MB, PhD,¹ Jocelyn Rouleau,¹ K.S. Joseph, MD, PhD,² Reg Sauve, MD, MPH,^{3,4} Robert M. Liston, MB, ChB,⁵ David Young, MD,⁶ Michael S. Kramer, MD,^{7,8,9} for the Maternal Health Study Group of the Canadian Perinatal Surveillance System

3 852 569 femmes dans la cohorte

35,6 / 10000 thrombose en cas d'HG

-> Soit **Augmentation du risque relatif ajustée : 4,4 (IC : 2,4-8,4)**

Evaluation du risque de TVP-EP en cas d'hospitalisation ? Bas de contention ? HBPM le temps d'hospitalisation ?

Question non abordées... situations particulières

NVG et HG chez les patientes ayant eu une chirurgie bariatrique

✓ Absent des différents groupes d'expert

Revue générale

Grossesses après chirurgie bariatrique: recommandations pour la pratique clinique (groupe BARIA-MAT)

Pregnancy after bariatric surgery: Clinical practical guidelines (BARIA-MAT Group)

1. Risque de carence nutritionnel et encéphalopathie augmentée
2. Problématique du diagnostic d'une complication chirurgicale

Question non abordées... situations particulières

NVG et HG chez les patientes ayant un diabète ?

Prise en charge après le retour à domicile

Après hospitalisation, plus de 50% de récives précoces

Prop 6.1: Il est proposé d'organiser la prise en charge des patientes avec hyperemesis gravidique autour d'un médecin référent lors de leur retour à domicile après hospitalisation

Coordination par médecin référent

**Mise en place d'un traitement à domicile avec IDE :
antiémétique et réhydratation par perfusion**

**Outils de suivi: poids, TA, état hydratation, PUQE score et
biologie si besoin**

IDE- médecin référent- Réhospitalisation

Messages clés

- ✓ Ecouter, expliquer, ne pas banaliser, ne pas abandonner
- ✓ Oui on peut proposer une prise en charge même si elle repose sur un faible niveau de preuve : Ni efficace, mais pas non plus inefficace
- ✓ Pas de classe médicamenteuse supérieure
- ✓ Les médicaments sont à utiliser des effets secondaires les moins aux plus importants
- ✓ Soutien psychologique et information de l'existence d'association de patienter
- ✓ Médecin référent