Embryons congelés: Stratégies de transfert

Said LAZRAK

Président AFOG

(African Federation of Obstetrics /Gynecology)

Gynazur 27/28 juin 2024

slazrak2@gmail.com

INTRODUCTION

- Taux d'implantation presque égal qu'en frais
- Taux cumulatif de grossesse
- Coût
- Traitement plus simple
- Programmation

HISTORIQUE

- Trounson A and Mohr L – Mature 1983 :
1^{ère} grossesse sur embryon congelé (8 cellules,
DMSO)
- Zeilmaker GH et al – Fertil Steril, 1984 :
2 grossesse, 1^{er} bébé né (DMSO)

HISTORIQUE

1983 – 2005 :

- Méthodes de congélation lente
- Cryoprotecteurs : DMSO, Propanediol
- Semi-automatisation, survie 50 à 60 %
- 5 à 10 % d'enfants-nés par embryon décongelé

2005 :

- Vitrification :
 - Méthode manuelle rapide
 - Efficacité augmentée
 - Taux de survie de 80 à 90 %
 - Taux d'implantation doublés

INDICATIONS DU TEC

FIV :

- Embryons surnuméraires
- Cycles annulés à cause d'un risque de OHSS
- Recherche de meilleurs résultats

Don d'ovocytes :

- Frais
- Congelés

Préservation de la fertilité :

- Médicale : cancer
- Sociale : mariage tardif

prog élevée sup a 1.5 ng/ml le j de hcg en cycle frais

- Fenêtre d'implantation est avancée du fait
- Altération endométriale +++ et de mauvaise réceptivité endométriale
- Pas d'effets sur la qualité ovocytaire et embryonnaire ??
- Le jour du déclenchement
- **Cut off** : 1.5 ng/ml à moduler avec le nombre d'ovocytes
- Que faire ? = FREEZE ALL : OUI

Effect of progesterone elevation in follicular phase of IVF-cycles on the endometrial receptivity

B Lawrenz ^{a,b,*}, HM Fatemi ^{a,1}

Impact négatif sur les taux de grossesse est observé si:

Bosch: $P_4 > 1.5 \text{ ng/ml}$ en cycle frais

Venetis (meta-analyse 60000 cycles): à partir de 0.8 ng/ml

Griesinger (Meta-A) $P_4 > 1.5 \text{ ng/ml}$: faible et Normale réponse

Requena : $P_4 > 1.8 \text{ ng/ml}$ impacte négatif hyper-réponses

Xu : $P_4 > 2.25 \text{ ng/ml}$ pour les hyper-réponses

TRANSFERT DES EMBRYONS CONGELÉS (VITRIFIÉS)

POLITIQUE DU SET UK (HEFA DATA)

TRANSFERT D'EMBRYONS VITRIFIÉS

- 30-40 % des transferts aujourd'hui sont des TEC
- La vitrification permet de récupérer la presque totalité des embryons congelés
- Le freez-all est une excellente alternative en cas de **risque d'OHSS**
- Transfert différé en cas de découverte d'une pathologie en cours de cycle, complication lors de la ponction, P₄ augmentée, PGT, préservation de fertilité
- Le freez-all est un choix pour certains centres
- Maitriser les différents protocoles est nécessaire pour réaliser un **taux cumulé de grossesse optimal**

ENDOMETRIAL PREPARATION REGIMENS

- Natural cycle
- Modified natural cycle (MNC)
- Hormonal therapy cycle (HTC)
- Hormonal therapy cycle with GnRH agonist
- Stimulated cycle

POLITIQUE DE TRANSFERT

TIMING DU REPLACEMENT

- Stratégie : remplacement synchrone des embryons par rapport à la maturation sécrétoire de l'endomètre

REPLACEMENT DES EMBRYONS

- Transfert dans une phase lutéale de bonne qualité
- Endomètre idéalement ≥ 8 mm
- Patiente avec cycle normal :

Transfert en cycle naturel

- Patiente sans cycle au spanioménorrhéique :

Cycle de substitution hormonale

TYPE DE PRÉPARATION ENDOMÉTRIALE

Cycle naturel : avec ou sans déclenchement

Cycle artificiel :

- Avec gonadotrophines
- Avec THS : oral, transdermique, gel, avec ou sans blocage par agoniste

CYCLE NATUREL

- Monitoring hormonal à partir de J10
- LH, E2, Prog, Echo follicule + endomètre J12
- Soit détection du pic de LH
- Soit administration d'hCG 5000 IU sur follicule sup à 18 mm et endomètre sup à 8 mm
- Progestérone en phase lutéale 3 x 200 mg (micronisée par voie vaginale)

TEC EN CYCLE NATUREL MODIFIÉ

- Echo vaginale début de cycle
- Echo vaginale J9-12 : endomètre (>7 mm) et follicule dominant (17-20 mm)
- Détection pic de LH
- Déclenchement HCG
- Dosage P₄ la veille du transfert (15-30 ng/ml)
- Soutien de Phase lutéale (progestérone vaginale ou HCG) pas d'évidence
- Transfert blasto à (HCG +7) ou si embryon J₃ à (HCG +5)
- Dosage de Bhcg 10 à 12 jours après TEC

TEC CYCLE SUBSTITUÉ

- Echographie après 8-14 jours d'estrogènes
- Endomètre > 7 mm trilaminaire et vérifier ovaires
- Demarrer Progestérone vaginale 600-800 mg/jour ou injectable 25-50 mg/ jour
- Dosage de progestérone la veille du transfert et ajuster
- Doit être sup à 8.8 ng/ml
- Transfert blasto Progestérone +6 et embryons J3 progestérone +4
- Test de grossesse 10 à 12 jours après TEC

MACKENS H.R 2017

Figure 2 Clinical practice proposal for embryo transfer timing in the different preparation methods. tOR, theoretical oocyte retrieval, E2, estradiol, P, progesterone, NC, natural cycle.

L'ADMINISTRATION D'OESTROGÈNES

- **Voie orale** : Valérate d'estradiol ou estradiol micronisé => 2 à 8 mg /j
- **Voie transdermique** : estradiol => 75 à 300 ug/2 à 3 jours
- **Moins utilisés** : dispositifs sous-cutanés, voie vaginale, voie IM

DÉSENSIBILISATION HYPOPHYSAIRE

AGONISTE GNRH

- L'inhibition de l'ovulation n'est pas toujours atteinte par un traitement à base d'estrogènes seuls (Simon et al 1998)
- Avantages : évite les annulations dues à une lutéinisation endométriale précoce
- Agoniste dépôt (ou journalier) : début environ 7 jours avant la date attendue des prochaines règles
 - Tendances en faveur de l'agoniste dépôt
 - Pas de différence entre dépôt et journalier

L'ADMINISTRATION DE LA PROGESTÉRONE

- Par voie vaginale, IM (ou sous-cutanés)
 - Voie orale : pas indiquée afin d'obtenir un support adéquat de la phase lutéale, pas de réponse sécrétoire adéquate
 - Voie vaginale : 200 à 800 mg/j
 - Voie IM : 25 à 100 mg/j
 - Voie sous cutanée
- Quand commencer ?
 - Le jour de la PF/dévitrication ovocytaire ou bien à J1 (Escriba et al, 2005)

PROTOCOLES TEC PLANIFIÉ

- Pilule + GnRH + Oestrogènes + Progestérones
- Pilule (variable selon programmation)
- Comprimés ou patchs au 21 jours de préparation endométriale
- Embryon J3 : transféré le 4^e jour de progestérone
- Embryon J5 : transféré le 6^e jours de progestérone

COMPARAISON DE 4 PROTOCOLES

Aucune différence

REVUE 2013

- Cycle naturel vs cycle naturel avec hCG
- Soutien de la phase lutéale
- Cycle naturel vs cycle artificiel
- Cycle naturel vs cycle artificiel avec GnRH α
- Cycle artificiel vs cycle artificiel avec GnRH α

Aucune différence

COCHRANE 2008-2010 : CONCLUSIONS

- Pas d'évidence suffisante pour recommander un protocole spécifique pour la préparation de l'endomètre en vue d'un TEC
- Meilleurs taux de grossesse et moins d'annulations si la progestérone est commencée le jour équivalent à la PF

POURQUOI CHOISIR UN TRAITEMENT OU UN AUTRE??

. Conditions médicales :

- Contre-indication pour un THS
- Accessibilité au control échographique et hormonal

. Questions d'organisation :

- Eviter les week end
- Organisation du patient
- Volume d'activité du centre

PROPOSITION DE CAT

- Simplicité
- Cout
- Effets secondaires

➔ Cycle naturel + HCG

- Endométriose
- SOPK
- Insuffisance ovarienne

➔ Cycle artificiel + aGnRH

EN CAS DE GROSSESSE SUR CYCLE SUBSTITUÉ

- prolonger la substitution hormonale jusqu'à 8 semaines de grossesse = période de relais placentaire.

Résultats

- Taux d'implantation ,de grossesses cliniques et de nouveau-nés vivants est presque identique entre les patientes avec un transfert en frais qu'en différé
- Elective froozen embryo transfer does improve reproductive outcome in normo-responder patients
- Celeda et al. ESHRE 2015

REMAINING QUESTIONS

- Should we Determine P level before day of embryo Transfer

Serum progesterone concentration and live birth rate in frozen-thawed embryo transfers with hormonally prepared endometrium

Cedrin RBMO 2018

PROGESTERONE a J-1 du TRANSFERT EN CYCLE NATUREL DE BLASTOCYSTE

Figure 1 Comparison of reproductive outcomes in patients with serum progesterone levels <10 and >10 ng/ml.

Table III Logistic regression model showing live birth rate according to serum progesterone levels (ng/ml) on the day before blastocyst frozen embryo transfer, adjusted for patients who did and did not undergo preimplantation genetic testing for aneuploidies and maternal age.

	OR	95% CI
Progesterone	1.05	1.02–1.09
PGT-A	2.49	1.41–4.44
Maternal age	0.95	0.89–1.01

OR, odds ratio.

THE DAY OF EMBRYO TRANSFER (DAY 5)

Study design, size, duration:

Prospective cohort study including 1166 patients undergoing embryo transfer after an artificial endometrial preparation cycle with estradiol valerianate and vaginal micronized progesterone (400 mg/12 hours).

Summary answer:

Patients with serum Progesterone levels <8.8 ng/mL the day of embryo transfer had significantly lower ongoing pregnancy rate than the rest of patients.

- *E Labarta. Human Reprod. 2017*
- *E Labarta. Oral Presentation. ESHRE 2019*

FACTS WITH P LEVEL ON HRT – FET CYCLES

- 30 % of patients with 800 mg Vaginal P have P level < 9.2 ng/ml
- 80 % of patients showed again the same level if Luteal Phase not corrected
- Patients with low level at day 5 are also found to have low P at day 4
- Adding with Sub Cut P (25mg / day) correct the Pregnancy rate and the miscarriage rate

Rescue Strategy 1

Antécédent de
P basse et pas
de grossesse

Rajout de P sous
cutanée

Rescue Strategy 2

Retrospective analysis

1642 artificial cycles for ET (December-March 2019)

HRT cycle: Estradiol valerianate + 400mg/12h natural micronized P

P basse le jour
du TEC
**Thérapie de
sauvetage**

Rajout de P sous
cutanée

TAKE HOME MESSAGE : CONGELÉS

rajout de la prog depend du j de laVE

- Si cong J3 transfert au 4eme j prog
- si J5 transfert au 6eme j de la prog?
- Cut off 8,5-9.2 ng/ml le plus communement admis sup a 8.8 NG/ML
- **Solutions si inf a ce taux** : rescue par une autre forme de progesterone: prog sous cutanée

CONCLUSION (1)

- L'implantation : processus complexe nécessitant une parfaite synchronisation entre endomètre et embryon
- Pas encore d'outil parfait pour l'étude la réceptivité endométriale
- Pas d'évidence suffisante pour recommander un protocole spécifique pour la préparation de l'endomètre en vue d'un TEC
- Le choix du protocole dépend des conditions médicales de la patiente et/ou de l'organisation de la patiente / centre d'AMP

***Merci pour votre
attention***